

## REGISTROS NOVEDOSOS

### REGISTRO RELEVANTE DE FAISÁN COMÚN (*Phasianus colchicus*) EN EL PARQUE NACIONAL LAGO PUELO, PROVINCIA DEL CHUBUT, ARGENTINA

#### RELEVANT RECORD OF COMMON PHEASANT (*Phasianus colchicus*) IN LAGO PUELO NATIONAL PARK, CHUBUT PROVINCE, ARGENTINA

ERNESTO E. JUAN<sup>1\*</sup> & ANDRÉS A. POZAS<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Conservación y Educación Ambiental, Parque Nacional Lago Puelo, Ruta Provincial 16 N° 14.772 (8431)- Lago Puelo (8431), Provincia del Chubut, Argentina.

\*ejuan@apn.gob.ar

**RESUMEN:** En Argentina, diversas especies de faisanes han sido introducidas con fines ornamentales y cinegéticos. En la actualidad, hay ciertas poblaciones salvajes. En este trabajo documentamos el primer registro de un ejemplar macho de Faisán Común (*Phasianus colchicus*) en la zona norte del Parque Nacional Lago Puelo, Chubut, Argentina.

**PALABRAS CLAVES:** Faisán Común (*Phasianus colchicus*), Phasianidae, especie exótica.

**ABSTRACT:** In Argentina, several species of pheasants have been introduced for ornamental and hunting purposes. At present, there are some wild populations. In this paper we document the first record of a male Common Pheasant (*Phasianus colchicus*) in the northern area of Lago Puelo National Park Chubut, Argentina.

**KEYWORDS:** Common Pheasant (*Phasianus colchicus*), Phasianidae, exotic species.

En Argentina, diversas especies de faisanes han sido introducidas en varias estancias con fines ornamentales y cinegéticos, pero viviendo solamente en estado doméstico o semidoméstico (Chebez & Rodríguez 2013). En estado salvaje, sólo prosperó el Faisán Plateado (*Lophura nycthemera*) en la Isla Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro; lugar donde se realizaron una de las primeras introducciones en Argentina, la cual fue llevada a cabo por Aarón Anchorena alrededor del año 1920 (Navas 1987). En la descripción que hace Navas (1987) de las especies introducidas en la época en que existía un zoológico (i.e., una estación de cría) en Puerto Radal, en la Isla Victoria, relata con nombre específico la presencia de cuatro especies de faisanes (Faisán Dorado, *Chrysolophus pictus*; Faisán Diamantino, *Chrysolophus amherstiae*; Faisán Dorso Negro, *Lophura leucomelanos*; y Faisán Plateado), no mencionando entre estas al Faisán Común (*Phasianus colchicus*). Por su parte, en el listado de aves exóticas que realiza Daciuk (1987) para la ya desmantelada estación zoológica, hace referencia al Pavo Real (*Pavo cristatus*), con lo que serían cinco las especies de faisanes que estaban presentes en la isla, y enumera genéricamente una posible sexta especie a la cual describe como "Faisanes (sin especificar variedad, probablemente mestizos)". En esa mención imprecisa, tal vez, pueda estar el conspicuo Faisán Común, dada su dispersión prácticamente mundial (Chebez & Rodríguez 2013). Por otro lado, es presumible que el Faisán Común pueda haber pasado desde Chile dado que muy cerca de la frontera con la Argentina, en una estancia sobre el río Allipén, en 1914 Carlos Haverbeck introdujo de manera exitosa ochenta faisanes de la subespecie *Phasianus colchicus tonquatus* (Goodall et al. 1951). En la actualidad, el Faisán Común figura como ave asilvestrada en el país vecino (Chebez & Rodríguez. 2013). Mucho más recientemente, Matarasso & Salaberry (2008) mencionan la suelta de 150 individuos de Faisán Común en la cuenca del río Quemquemtreu, en la provincia del Neuquén. Los nombrados autores dicen haber observado que al segundo año de esta suelta había parejas que habían reproducido en la zona. El 20 de septiembre de 2021, a las 14:36 h, observamos y fotografiamos la presencia de un macho de Faisán Común en la zona



**Figura 1:** Faisán común (*Phasianus colchicus*) fotografiado el 20 de septiembre de 2021 en la zona norte del Parque Nacional Lago Puelo, Chubut, Argentina. Fotografía: Juan EE.

norte del Parque Nacional Lago Puelo, Chubut, Argentina (Fig. 1; 42°05'0'' S; 71°37'0'' O; 200 msnm). Esta especie exótica no había sido registrada anteriormente para esta área protegida, encontrándose el registro más cercano entre Mallín Ahogado y el Manso en la Provincia de Río Negro (eBird 2022).

#### REFERENCIAS

- CHEBEZ JC & RODRÍGUEZ GO. (2013). La Fauna Gringa. Especies Introducidas en la Argentina. Fundación de Historia Natural Félix de Azara y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires.
- DACIUK J. (1978). Notas Faunísticas y bioecológicas de Península Valdes y Patagonia III: Aclimatación de aves y mamíferos en el Parque Nacional Nahuel Huapi (provincias de Neuquén y Río Negro, Argentina) con especial referencia a los fasiánidos. Anales de Parques Nacionales, 14: 96-104.
- eBIRD. (2022). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (25/04/2022).
- MATARASSO H & SALABERRY G. (2008). Faisanes en la Patagonia. Revista de Naturaleza y Conservación, Aves Argentinas, 22: 19-21.
- NAVAS J. (1987). Los vertebrados exóticos introducidos en la Argentina. Revista del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Zoología, 16: 1-38