

REGISTROS NOVEDOSOS

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DE TANGARÁ CABEZA CELESTE
(*Chlorophonia cyanocephala*) EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

FIRST DOCUMENTED RECORD OF THE GOLDEN-RUMPED EUPHONIA (*Chlorophonia cyanocephala*)
IN THE PROVINCE OF SANTA FE, ARGENTINA

MARIA BEATRIZ SERRA¹ & MARIA CAMILA PERUSINI*

¹COA TILALÁ, San Javier Santa fe – Ms. en manejo de vida silvestre UNC – mbeatrizserra@hotmail.com

*camilaperusini@gmail.com

RESUMEN: La distribución habitual del Tangará Cabeza Celeste (*Chlorophonia cyanocephala*) en Argentina abarca las provincias del noreste. En Santa Fe, la especie fue observada dos veces. En este trabajo reportamos la tercera observación de la especie en la provincia de Santa Fe y la primera documentada. Estos registros son novedosos por la latitud alcanzada por estos individuos dentro del patrón migratorio invernal regular.

PALABRAS CLAVE: Tangará Cabeza Celeste (*Chlorophonia cyanocephala*), Finch, distribución, monte ribereño, patrón migratorio invernal.

ABSTRACT: The usual distribution of the Golden-rumped Euphonia (*Chlorophonia cyanocephala*) in Argentina spans the north-eastern provinces. In Santa Fe, the species was observed twice. Here we report the third observation for the species in that province and the first one documented. These records are novel due to the latitude reached by this species within the regular winter migration pattern.

KEYWORDS: Golden-rumped Euphonia (*Chlorophonia cyanocephala*), Finch, distribution, riparian forest, winter migration pattern.

La distribución geográfica del Tangará Cabeza Celeste (*Chlorophonia cyanocephala*) en Sudamérica es amplia y disyunta, abarcando un bloque oeste andino y del norte, separado ampliamente de un bloque atlántico en el este (Ridgely & Tudor 2009). En Argentina, la especie se la encuentra en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el noreste de Santa Fe (De la Peña 2015). El 31 de julio de 2021 observamos y fotografiamos un Tangará Cabeza Celeste macho adulto en un monte ribereño de Espinillos (*Vachelia caven*) en la localidad de El Laurel, provincia de Santa Fe (Fig. 1; 30°59'S, 60°03'E; 20 msnm). El individuo fue visto solo alrededor de las 15 h recorriendo por varios minutos un Espinillo y alimentándose de frutos de una planta epífita hemiparásita (*Phoradendron quadrangulare*; Fig. 2). Este registro novedoso se suma a dos observaciones previas en la provincia de Santa fe. En la primera, Mayo de 1988, se reportaron varios individuos aún más al sur, en Cayastá (departamento Garay; De La Peña 1996), y en la segunda, más reciente, un individuo macho fue visto al norte, en Jaaukanigás (Dpto. Gral Obligado) en Agosto de 2007 (Fandiño & Giraudó 2008). Estos registros concuerdan con el patrón migratorio invernal regular descrito por Areta & Bodrati (2010), quienes mencionan otros registros invernales de Tangará Cabeza Celeste para selvas altas en el Chaco Húmedo del Riacho Pilagá, Formosa (P. Capllonch *in litt*). Por otro lado, la especialización alimenticia del Tangará Cabeza Celeste por la planta *Phoradendron* sp. pareciera ser una restricción importante que limita la distancia a la que pueden moverse los individuos, lo cual podría imponer límites ecológicos a sus distribuciones geográficas (Areta & Bodrati 2010). Este registro novedoso resulta importante para la zona ya que aporta una nueva localidad de invernada para la especie. Además, es el primero documentado en la provincia de Santa Fe.



Figura 1: Tangará Cabeza Celeste (*Chlorophonia cyanocephala*) posado en un Espinillo (*Vachelia caven*) el 31 de Julio de 2021 en El Laurel, Santa Fe, Argentina. Fotografía: Perusini MC.



Figura 2: Planta epifita hemiparasita (*Phoradendron quadrangulare*) fotografiada el 31 de julio de 2021 en El Laurel, Santa Fe, Argentina. Fotografía: Perusini MC.

AGRADECIMIENTOS

A Graciela Cortinovis por su amabilidad. A Cappovila, Pablo Hernan; Beltrocco, Eduardo; Franco, David y Juani, Marcelo por su ayuda.

REFERENCIAS

- ARETA JI & BODRATI A. (2010). Un sistema migratorio longitudinal dentro de la selva atlántica: movimientos estacionales y taxonomía del Tangará cabeza celeste (*Euphonia cyanocephala*) en Misiones (Argentina) y Paraguay. *Ornitología Neotropical*, 21: 71–86. The Neotropical Ornithological Society.
- DE LA PEÑA, M.R. (1996). Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. *Homero*, 14 : 087-089
- De la Peña MR. (2015). Atlas ornitogeográfico de la Provincia de Santa Fe. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 4. Ediciones Biologica.
- FANDIÑO, B. & A. R. GIRAUDO. (2008). Aves nuevas o poco conocidas de Santa Fe (Argentina), incluyendo los sitios Ramsar Jaaukanigás y Melincué. *Natura Neotropicalis* 39.
- RIDGELY RS & TUDOR G. (2009). Field guide to the songbirds of South America: the passerines. University of Texas press, Austin.